

REMINDER CARD COVID-19-VACCINATIE

- **Basisvaccinatie:** De meeste COVID-19-vaccins bestaan uit 2 **dossissen** elk met een eigen tijdsinterval tussen de 2 dossissen. Om een optimale bescherming te krijgen moet het aantal dossissen en het **tijdsinterval** gerespecteerd worden.
 - Pfizer (Comirnaty): dosis 2 na min. 19 dagen
 - Moderna (Spikevax): dosis 2 na min. 26 dagen
 - AstraZeneca (Vaxzevria): dosis 2 na min. 28 dagen (4 w.)Tip: vraag na of de burger al een corona-vaccin ontvangen heeft. Zo ja, welk vaccin en wanneer? Zo vermijd je fouten hiertegen.
- **Toegediende vaccins moeten van hetzelfde merk zijn.** Combinaties van vaccins van verschillende merken/firma's zijn niet toegestaan. Controleer dat je het juiste vaccin als 2^{de} dosis geeft.
 - **Leeftijdsgrens AZ:** 41 jaar
 - **Leeftijdsgrens Janssen:** 41 jaar + opt-in vanaf 18 jaar
 - **Zwangere vrouwen:** mRNA-vaccin (Moderna of Pfizer) + bij outreachende vacc. mag Janssen
 - **Jongeren t.e.m. 12 jaar:** enkel Pfizer of Moderna!
 - **Jonger dan 12 jaar niet vaccineren** (12j. op dag van vacc.)
 - Leeftijd bepaald a.d.h.v. **geboortedatum** (dag en maand), niet enkel geboortejaar!
- **Extra of boosterdos**
 - Vaccinatie met mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna)
 - Ook na basisvaccinatie met AstraZeneca of Janssen
 - Interval na basisvaccinatie:
 - Minimum 28 dagen (extra dosis)
 - Booster: 2 maand na Janssen, 4 maand na AstraZeneca, 6 maand na Pfizer of Moderna
 - Opnieuw minimum 15min wachttijd

- Volg SOP anamnese en SOP vaccinatie
 - Tijdens de anamnese wordt bijzonder aandacht gegeven aan een voorgeschiedenis van **allergieën**
 - Volg **procedure toestemming bij jongeren 12-15 jaar**
 - **Extra- of booster-dosis**
 - Basisvaccinatie AstraZeneca of Janssen? SOP dosis 1
 - Basisvaccinatie Pfizer of Moderna? SOP dosis 2

- Klaargemaakt vaccin: bescherm deze van het licht & niet schudden

Controleer merk, vervaluur en hoeveelheid in de spuit

 - Pfizer (Comirnaty): 0,3 ml
 - Moderna (Spikevax)
 - Basis of extra dosis: 0,5 ml
 - Booster: 0,25 ml
 - AstraZeneca (Vaxzevria): 0,5 ml
 - Janssen: 0,5 ml

- COVID-19-vaccins worden **intramusculair** geplaatst in de deltoïdspier (bovenarm) of in de anterolaterale spier van de dij

Aandachtspunten zijn:

 - Huid strak trekken (IM-inspuiting)
 - Geen ontsmetting van de huid noodzakelijk
 - Geen aspiratie voor toediening noodzakelijk

