

REMINDER CARD COVID-19-VACCINATIE

- De meeste COVID-19-vaccins bestaan uit **2 dosissen** elk met een eigen tijdsinterval tussen de 2 dosissen.
Om een optimale bescherming te krijgen moet het aantal dosissen en het **tijdsinterval** gerespecteerd worden.
 - Pfizer (Comirnaty): dosis 2 na min. 19 dagen
 - Moderna: dosis 2 na min. 26 dagen
 - AstraZeneca (Vaxzevria): dosis 2 na min. 51 dagen (±8 w.)Tip: vraag na of de burger al een corona-vaccin ontvangen heeft. Zo ja, welk vaccin en wanneer? Zo vermijd je fouten hiertegen.
- **Toegediende vaccins moeten van hetzelfde merk zijn.**
Combinaties van vaccins van verschillende merken/firma's zijn niet toegestaan. Controleer dat je het juiste vaccin als 2^e dosis geeft.
- Volg SOP anamnese en SOP vaccinatie
Tijdens de anamnese wordt bijzonder aandacht gegeven aan een voorgeschiedenis van **allergieën**
- Klaargemaakt vaccin: bescherm deze van het licht & niet schudden
Controleer merk, vervaluur en hoeveelheid in de spuit
 - Pfizer (Comirnaty): 0,3 ml
 - Moderna: 0,5 ml
 - AstraZeneca (Vaxzevria): 0,5 ml
 - Janssen: 0,5 ml
- COVID-19-vaccins worden **intramusculair** geplaatst in de deltoïdspier (bovenarm) of in de anterolaterale spier van de dij
Aandachtspunten zijn:
 - Huid strak trekken (IM-inspuiting)
 - Geen ontsmetting van de huid noodzakelijk

- Geen aspiratie voor toediening noodzakelijk

