


SOP ANAFYLAXIE NA VACCINATIE (incl. kind)

VOORBEREIDING	<p>NOODMEDICATIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 2 ampullen adrenaline 1mg/ml - Salbutamol puffer - Levocetirizine 5mg comprimé - Levocetirizine siroop (0.5mg/ml) - Methylprednisolone 125 mg (IV) (1mg/kg) - min. 2x500ml NaCl 0.9% - zuurstof (fles 2liter/200 bar) 	<p>MATERIAAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - stethoscoop + bloeddrukmeter + O2-saturatiemeter - beademingsballon met masker - voorzetskamer voor puffer met masker: Aerochamber Plus A/static+flow-vu-mask Adul, flow-vu-mask pediatric. - zuurstoffles met ontspanner, zuurstofleiding, -masker met en zak + masker voor kind - materiaal voor IV lijn (infuusnaald, leiding met driewegkraan, tourniquet, kleefpleister, alcoholswab) + voor kinderen → voor toediening Methylprednisolone IV indien gewenst - spuit 5cc, optreknaald, SC naald (i.f.v. toediening Solumedrol) - telefoon (bel 112 voor MUG-oproep melding 'anafylaxie') met 112-app - automatisch externe defibrillator
----------------------	--	--

Voorzie vaccinatie en EHBO-lokaal dat bereikbaar zijn voor dringende hulpverlening
Plaats patiënt in een zittende of liggende houding (wees bedacht op bloeddrukval)

OBSERVATIE i.k.v. ANAFYLAXIE	<p><u>DERMATOLOGISCH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwelling gelaat, keel, mond mucosa - Huiduitslag - Flushing (=roodheid) 	<p><u>CARDIOVASCULAIR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plots tachycardie (= snelle pols) én hypotensie (= lage bloeddruk) - Retrostenale pijn - Bewustzijnsverlies - Hartstilstand - Draaiduizeligheid 	<p><u>RESPIRATOIR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plotse heesheid - Plotse wheezing (= bemoeilijkte en/of piepende ademhaling) - Droge hoest - Benauwdheid - Kortademigheid 	<p><u>GASTRO-INTESTINAAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Misselijkheid - Braken - Diarree - Abdominale krampen
<p>ANAFYLAXIE = Dermatologische + MINSTENS 1 respiratoire of cardiovasculair symptoom OF MINSTENS 2 dermatologische, respiratoire of gastro-intestinale symptomen</p>				

SOP ANAFYLAXIE NA VACCINATIE (incl. kind)



Bron: E. Duyver, T. Van de Velde, D. Razooqi, K. Versluys, M. Petrovic, N. Van Den Noortgate - Dienst Geriatrie, Universitair Ziekenhuis Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent

Ingediend bij Tijdschrift voor Geneeskunde (2021), bewerkt door M. Vanpoecke - huisarts, ELZ Noord-Limburg en Agentschap Zorg en Gezondheid.