


















Scan kids-ID / ISI+-kaart v.h. kind + controleer juiste vacc.lijn → Niet ok? Steward brengt burger naar de juiste lijn

Vraag	JA	Actie
1. Heb je al een corona-vaccin gehad?	Zie actie	Controleer vaccinatieschema en interval (Pfizer: 2 doses, 21d. apart)
2. Voel je je vandaag ziek? (koorts, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen, niet goed ruiken, ...)		Evaluatie door arts Bij acute infectie uitstel tot na volledig herstel
3. Heb je de voorbije 14 dagen klachten (symptomen) gehad door corona en had je corona volgens een test?		Uitstel tot 14 dagen na de laatste symptomen (symptomatisch)
4. Heb je een test voor corona gehad in de voorbije 14 dagen en had je corona volgens die test zonder klachten (symptomen)?		Uitstel tot 14 dagen na de test (asymptomatisch) of 14 dagen na de laatste symptomen (symptomatisch)
5. Ben jij (kind) of je ouder nu in quarantaine? Bijvoorbeeld: omdat je contact had met iemand met corona.		Uitstel tot na quarantaine
6. Ben je allergisch voor PEG (polyethyleenglycol) of polysorbaat?		NIET GEKEND: Volgende vraag JA: Allergie beslissingsboom
7. Heb je ooit heel allergisch gereageerd op een medicijn of vaccin?		Allergie beslissingsboom
8. Heb je ooit een anafylaxie (= ernstige levensbedreigende allergische reactie) gedaan?		Allergie beslissingsboom
9. Heb je ooit quince oedeem (= zwelling in de keel, tong) gehad?		Allergie beslissingsboom
10. Heb je systemische mastocytose of erfelijk angio-oedeem?		NIET GEKEND: Volgende vraag JA: Allergie beslissingsboom, ZH-vaccinatie
11. Heb je astma? En heb je veel last hiervan, ook al neem je medicijnen hiervoor?	30min	Schrijf '30' op VCkaartje
12. Heb je nog vragen?		Informeer burger over: (1) merk vaccin + bijwerkingen vaccin (paracetamol mag!!), (2) belang maatregelen blijven volgen, (3) wachttijd 15/30min uitleggen
BURGER MAG NAAR VACCINATOR geef VCkaartje mee (naam, datum 2° afspraak)		

Scan kids-ID / ISI+-kaart v.h. kind + controleer juiste vacc.lijn en VCkaartje voor type vaccin → Niet ok? Steward brengt burger naar de juiste lijn

	Vraag	JA	Actie
1.	Heb je al een corona-vaccin gehad? Welk merk? Hoe lang geleden?	Zie actie	Controleer merk + mimimuminterval: Pfizer (Comirnaty), min. 19d. • Probleem interval? Arts • Verkeerd merk? Steward brengt burger naar juiste lijn
2.	Voel je je vandaag ziek? (koorts, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen, niet goed ruiken, ...)		Evaluatie door arts Bij acute infectie uitstel tot na volledig herstel
3.	Heb je de voorbije 14 dagen klachten (symptomen) gehad door corona en had je corona volgens een test?		Uitstel tot 14 dagen na de laatste symptomen (symptomatisch)
4.	Heb je een test voor corona gehad in de voorbije 14 dagen en had je corona volgens die test <u>zonder klachten</u> (symptomen)?		Uitstel tot 14 dagen na de test (asymptomatisch) of 14 dagen na de laatste symptomen (symptomatisch)
5.	Ben jij (kind) of je ouder nu in quarantaine? Bijvoorbeeld: omdat je contact had met iemand met corona.		Uitstel tot na quarantaine
6.	Reageerde je heel allergisch op je eerste vaccin tegen corona en had je medische hulp nodig?		Allergie beslissingsboom
7.	Had je na je eerste vaccin een zwelling in je keel, tong (quincke oedeem) of problemen met ademen?		Allergie beslissingsboom
8.	Heb je ooit quincke oedeem gehad? (= zwelling v.d. keel, tong)	30min	Schrijf '30' op VCkaartje
9.	Heb je ooit een anafylaxie gedaan? (= ernstige levensbedreigende allergische reactie)	30min	Schrijf '30' op VCkaartje
10.	Heb je astma en heb je veel last hiervan, ook al neem je medicijnen hiervoor?	30min	Schrijf '30' op VCkaartje
11.	Heb je nog vragen?		Informeer burger over: (1) merk vaccin + bijwerkingen (paracetamol mag!!), (2) belang maatregelen blijven volgen, (3) wachttijd 15/30min uitleggen

**BURGER MAG NAAR VACCINATOR
geef VCkaartje mee**

SOP VACCINATIE KIND

Handhygiëne respecteren
Ontsmet stoelen **regelmatig**

Indien burger **onwel**: roep arts
VC erbij

Code VCkaartje:
30: 30min in wachtruimte

Neem kids-ID / ISI+-kaart v.h. kind en
VCkaartje + geef instructie om arm bloot te
maken

- Scan kids-ID / ISI+-kaart
- Controleer vacc.lijn + vaccin-type (PC en
VCkaartje)

- Kijk het vaccin goed na: type vaccin, vervaluur,
kwaliteit vloeistof en hoeveelheid in spuit
- Scan vaccin in Doclr
- VCkaartje, noteer: merk vaccin, lotnummer,
datum toediening
- Bekijk aandachtspunten vacc.: plaats prik +
wachtijd

**Vaccinatie van kinderen 5-11j. met
Pfizer kindervaccin (Comirnaty) 0,2 ml**
Spuit niet schudden + beschermen van het
licht!

**Kind: opgelet met naaldlengte, moet
intramusculair!**
Voor meer info over priktechniek bij
kinderen zie het medisch-verpleegkundig
draaiboek

Begin vaccinatie

Neem je
bloedverdunners?

Min. 2 minuten afdrücken
(vraag de ouder dit)

Vaccinatie: huid niet
ontsmetten, niet aspireren,
huid strak trekken + naald
loodrecht inbrengen
Nadien: naald meteen in
naaldcontainer, nooit
herkappen!

Herhaal wachtijd 15/30min

Registreer toediening in
Doclr

Burger mag naar rustruimte
Geef VCkaartje en evt. folder mee

